

### Títol proves

Test Tolerància Oral a la glucosa ( 50 g) (60min)  
Test Tolerància Oral a la glucosa (100g) (0,60,120,180min)  
Test Tolerància Oral a la glucosa (75g) (0,60,120min)  
Test Tolerància Oral a la glucosa (post àpat estàndard) (0,120min)  
Secreció FSH,LH,estradiol,17OHprogesterona # ( PROCRIN hiperandrogenisme femení)  
Secreció FSH,LH,estradiol,testosterona # (0,5 mg leuprorelina acetat s.c.)  
Test d'absorció de Levotiroxina  
Pac-Secreció de somatotropina i cortisol #(post insulina)  
Ritme de Cortisol  
Secreció de cortisol (després d'administrar 85 nmol (0,25 mg) #tetracosactida i.v.) (0,30,60min)  
Supressió ràpida amb dexametasona (1mg)  
Adr-Secreció de cortisol (després de 2,5 umol (1 mg) #de dexametasona p.o.a les 23:00 h)  
Hph-Secreció de fol-litropina i lutropina#(Luforan)  
Pan-Secreció de pèptid C# (després de 0,3 umol (1 mg) de glucagó i.v.) (0,6min)  
Frenació de somatotropina #(després de 75g de glucosa v.o.)  
Somatotropina post estímul (propranolol+exercici)  
Secreció de somatotropina (després de 375 mg per 1,73 m<sup>2</sup>#de superfície corporal de Levodopa)  
Estimulació de Somatotropina amb glucagó  
Secreció de somatotropina (després de 3,4 mmol #per kg de massa corporal de propranolol + exercici)  
Secreció de somatotropina (després d'exercici)  
Secreció de somatotropina (després de 0,075 mg per m<sup>2</sup>#de superfície corporal de clonidina)  
Secreció d'insulina (després de 75 g de glucosa p.o.)  
Prova d'ortostatisme i deambulació  
Prova d'estimulació amb tetracosàctida#(Synacthen)  
Secreció de 17-hidroxiprogesterona (després de 85 nmol# (0,25 mg) de tetracosactida i.v.) (0,60min)  
Secreció renina, aldosterona (0,25 mg Captopril p.o )  
Secreció gastrina (després 1UI secretina/kg i.v.)  
Secreció d'Estradiol, LH, FSH, 17 OH Progesterona # (després de Leuprorelina) (24h.)  
Test del PROCRIN hiperandrogenisme  
Test del PROCRIN basal (nens)  
Test del PROCRIN basal (nens)  
Test del PROCRIN 24 h (nens)  
Test del PROCRIN 24 h (nens)